

Uitvoeringsverzoek thuiszorg regio Oss-Uden-Meierijstad

versie 1 29-3-2020 MvC

Uitvoeringsverzoek/opdracht tot een voorbehouden, risicovolle of overige handeling van de arts aan de medewerker thuiszorg omtrent genoemde cliënt in het kader van de Wet BIG of anderszins.

	telefoonnummer	cliënt	
Arts:		Naam	
Thuiszorg:		geboortedatum	
Contactpersoon thuiszorg	Naam:	telefoonnummer	
huisartsenpost	088-8765050	contactpersoon	
		telefoonnummer	

De arts verzoekt, indien van toepassing, onderstaande handeling uit te voeren in het kader van de afgesloten 'Raamovereenkomst voorbehouden, risicovolle en overige handelingen' (conform de daartoe opgestelde protocollen).

1	Handeling: - Plaatsen van een subcutaan naaldje voor toedienen medicatie - Toedienen van de hieronder vermelde medicatie - Plaatsen en verzorgen van een verblijfscatheter - Anders:	
2	Indicatie/diagnose: - Dyspnoe bij Covid-19 - Delier - Palliatieve sedatie - Urineretentie	
	Toe te dienen medicatie (kruis aan welk middel toegediend moet worden)	opmerkingen
A	Morfine subcutaan - Dosering: zo nodig 6 x daags (= iedere 4 uur) 5 mg (= 0,5ml) intermitterend - Dosering zo nodig 4 x daags (= iedere 6 uur) 5 mg (= 0,5ml) bij erg kwetsbare mensen en slechte nierfunctie intermitterend Continue infuus bij klaring >40ml/min: Bolus 5mg en start 15mg/24 uur. Bij onvoldoende effect na 6-8 uur: nogmaals bolus 5-10 mg en dosering morfine verhogen met 50%.	Intermitterend: bij een slangetje aan het vleugelnaaldje: Iedere keer naspoeien met 1 milliliter NaCl (om morfine uit slangetje te spuiten)

B	○ Haldol subcutaan ○ 5mg/24 uur of iedere 12 uur bolus 2,5 mg ○ Andere dosis:	
C	Midazolam subcutaan ○ Startdosis 10 milligram (= 2 ml) Intermitterende sedatie: 6dd 5-10mg, zo nodig na 4 uur ophogen met 50%. Continue sedatie: ○ 1,5 mg/uur bij mensen > 70 jaar ○ 2,5 mg/uur bij mensen < 70 jaar ○ bij onvoldoende effect de dosis na 4 uur met 50% ophogen in combinatie met bolus van 5 mg. Indien de verhoging geen comfort biedt na 4 uur: raadpleeg de arts ○ Andere dosis, namelijk:	Op ieder dosis niveau kan bij onvoldoende effect iedere 2 uur een extra bolus van 5 mg s.c. worden gegeven
6	Specifieke problemen die bij deze patiënt kunnen optreden:	
7	Specifieke afspraken bij deze patiënt:	

Plaats en dagtekening:

Handtekening arts: