

Tabel 3. Opties intermitterende toediening van sedativa, voornamelijk extramuraal toegepast.

Middel	Toedienings-vorm **	Dosering	Frequentie
Lorazepam *	Tablet sublinguaal of oraal	1-4mg	elke 4 uur
Rescue	Infusievloeistof 4mg/ml Bucaal	1-4mg	maximaal 3dd
Clonazepam* (Rivotril)	Tablet sublinguaal of oraal Druppelvloeistof 2,5mg/ml Bucaal	1-2,5mg	elke 6 uur
Rescue	Druppelvloeistof 2,5mg/ml Bucaal	0,5-1mg	maximaal 3dd
Diazepam	Tablet oraal Rectiole (rectaal)	10-50mg 10mg	Elk uur tot voldoende sedatie bereikt is Gemiddeld 40-60mg/24 uur nodig Hierna 1-5x per dag
Rescue	Rectiole (rectaal)	10mg	
Midazolam**	Injectie vloeistof 1mg/ml	5-10mg s.c.	6 dd zn na 2 uur bolus 5mg s.c. zn elke 4 uur verhogen in stappen van 50%
Rescue	Injectie vloeistof 1mg/ml Neusspray 0,5 of 2,5mg/dosis	5mg s.c 1-2,5mg	zn na 2 uur

NB. Maak een keuze voor 1 van de bovenstaande middelen op basis van beschikbaarheid en praktische toepasbaarheid.

* Lorazepam en clonazepam zijn niet geregistreerd voor sublinguale toediening. De praktijk leert dat lorazepam (als tablet of inhoud ampul) en clonazepam (in druppelvorm) sublinguaal toegediend kunnen worden.

** Intermitterende sedatie subcutaan: er kan gebruik worden gemaakt van een subcutaan ingebrachte infuusnaald of butterfly met driewegkraantje.