

Medicamenteuze symptomatisch behandeling:

Codeïne 10mg,20mg tabletten	6dd 10-20mg	- In combinatie met laxans - Niet als patiënt al een opioïd gebruikt
MS contin t 10,20mg tabletten Morfine drank 5mg/1ml	2dd 10-20mg zn 6dd 5mg p.o.	- In combinatie met laxans - Indien patiënt reeds een opioïd gebruikt dosering met 50% verhogen - Rescue medicatie
Gabapentine 100,300,400mg capsule	2dd 100-800mg	Bij droge hoest, niet reagerend op opioïden
Dexamethason 4mg tabletten	1dd 4-8mg	- Indicaties: - o Centrale obstructive - o Lymphangitis carcinomatosa - o Pneumonitis door radio- of chemotherapie - o Vena cava superior syndroom - o COPD - Na 7 dagen effect evalueren, - o Effectief: dosering geleidelijk verlagen naar laagst mogelijke dosis - o Niet effectief: Staken ADD: - o <3 weken gebruikt: direct staken - o >3 weken gebruikt: afbouwen
Lidocaïne 2% oplossing Salbutamol 0,5% oplossing (1ml=5mg)	4dd 5ml Lidocaïne met 0,5-1ml van de Salbutamol	- Bij therapie resistent hoesten - Vernevelen

ADD: alle opioïden zijn in wezen geschikt voor de behandeling van hoesten.